

Ospedale/università: _____ Servizio: _____ Reparto: _____

Staff Attitude to Coercion Scale (SACS) ©

Questo questionario contiene alcune affermazioni sull'uso della coercizione. Rispondi ciò che, secondo te, il tuo gruppo di lavoro pensa a proposito dell'utilizzo della coercizione. Indica in una scala da 1 a 5 quanto pensi che il tuo ambiente di lavoro sia d'accordo o in disaccordo con ognuna di queste affermazioni.

Questo probabilmente varierà e dipenderà molto dalla situazione in cui si lavora e dalle tipologie di pazienti con cui ci si trova a lavorare. Per questo motivo non c'è una risposta esatta o errata in assoluto. Lo scopo del questionario è rendere un'immagine di quello che ciascuno pensa sull'atteggiamento del gruppo verso l'uso della coercizione.

Le vostre risposte individuali saranno trattate in modo anonimo e in forma aggregata e verranno utilizzati solo i valori medi per gruppo di lavoro.

Leggi attentamente queste affermazioni e valuta ognuna con un punteggio da 1 a 5 nel modo seguente:

1 Molto in disaccordo	2 In disaccordo	3 Indifferente	4 D'accordo	5 Molto d'accordo
------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------	--------------------------

Nel caso in cui una affermazione non sia applicabile al tuo gruppo di lavoro metti una crocetta nella casella 1 "Molto in disaccordo". Se sei indeciso su cosa rispondere metti una crocetta nella casella 3 "Indifferente".

	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
1 I pazienti in fase regressiva hanno bisogno del trattamento coercitivo	<input type="checkbox"/>	9 Il trattamento coercitivo può essere un'opzione sicura per i pazienti con malattia grave	<input type="checkbox"/>								
2 Di tanto in tanto è necessario, ricorrere al trattamento coercitivo per garantire le condizioni di sicurezza	<input type="checkbox"/>	10 I pazienti che non hanno consapevolezza di malattia hanno bisogno del trattamento coercitivo	<input type="checkbox"/>								
3 Il trattamento coercitivo può danneggiare l'alleanza terapeutica	<input type="checkbox"/>	11 Nei pazienti che manifestano un comportamento aggressivo e pericoloso è necessario l'uso del trattamento coercitivo	<input type="checkbox"/>								
4 Il trattamento coercitivo è un segno di fallimento dei servizi di salute mentale	<input type="checkbox"/>	12 In caso di situazioni di pericolo è necessario ricorrere al trattamento coercitivo	<input type="checkbox"/>								
5 Il trattamento coercitivo può essere compatibile con una gestione empatica e attenta del paziente	<input type="checkbox"/>	13 Si ricorre troppo spesso al trattamento coercitivo	<input type="checkbox"/>								
6 Bisognerebbe ricorrere più frequentemente al trattamento coercitivo	<input type="checkbox"/>	14 Il ricorso al trattamento coercitivo aumenta in condizioni di scarsità di mezzi e risorse	<input type="checkbox"/>								
7 Il trattamento coercitivo può prevenire lo sviluppo di situazioni pericolose	<input type="checkbox"/>	15 Si potrebbe ridurre il ricorso al trattamento coercitivo destinando più tempo al dialogo coi pazienti	<input type="checkbox"/>								
8 Il trattamento coercitivo è traumatizzante per i pazienti	<input type="checkbox"/>										

Vi preghiamo di controllare di aver risposto a tutte le affermazioni.

Grazie per la collaborazione!